

SFGH Anesthesia Preop Clinic

...your trusted source of information



San Francisco General Hospital
1001 Potrero Avenue
San Francisco, CA 94110

電話：(415) 206-5693
傳真：(415) 206-5811

email : SFGHAnesPreOP@anesthesia.ucsf.edu

MRN:

Name:

DOB:

Preoperative Checklist (術前核對表)

- 在鎮靜、麻醉，或服用止痛藥的24小時前後，請勿飲用任何含酒精的飲料。
- 在手術前至少48小時，請勿使用任何娛樂性藥物，例如大麻或可卡因。
- 在手術的前一天，手術中心將會在中午至下午2點之間致電您，並告知您抵達醫院的時間。如果您並未接到電話，請在下午3點至5點之間，致電手術中心，電話：(415) 206-8133。如果您未進行確認，手術可能會被取消。
- 我們會盡可能減少您的等待時間，但請記住我們是一間創傷醫院，因此如果有急診情況發生，您的手術可能會被延後。

手術的前一天晚上：

- 手術前一天的午夜後請勿進食。
- 在您抵達醫院最多2小時前，您可以飲用「清澈的液體」。清澈的液體包含：水、清澈的果汁、碳酸飲料（汽水）、茶，或不含牛奶的咖啡。請勿飲用任何含有牛奶的飲料，例如：卡布奇諾(cappuccino)或奶昔。如果給予您腸道準備的特殊指示，請密切遵守。
- 請攜帶容器來存放假牙、活動牙橋、隱形眼鏡及眼鏡
- 請將所有貴重物品留在家中，例如：珠寶、身體穿環、信用卡、電子產品、手錶，以及多餘現金。本院不對遺失物品負責。
- 如果您有使用吸入器，請隨身攜帶。

關於門診手術，我了解：

- 我必須安排一名負責任的成年人，在手術出院後陪伴我回家。我不可以自行乘坐大眾運輸工具。
- 在鎮靜或全身麻醉的24小時內，我不可以開車或操作任何類型的機械。
- 如果在手術期間或在手術後出現嚴重的症狀，我可能會需要住院治療。
- 如果出院後有任何未預期的出血、高燒、呼吸困難，或嚴重疼痛，我會立刻撥打 911 或請某人帶我去急診室。

手術當天

- 用香皂與清水清洗手術部位。請勿在手術部位上使用任何乳液、乳霜、粉末或油脂。
- 請勿剔除手術部位的毛髮。

Not part of the medical record

- 請勿化妝，並清除所有指甲油。
- 在指定的時間至三藩市總醫院3樓，並在 (Surgicenter) 房進行掛號登記。 3F16

用藥指示

手術當天，請照常服用藥物，除了：

- Metformin: 二甲雙胍: 手術前一晚「請勿」服用，手術當天早上「請勿」服用
- Glipizide: 格列吡嗪: 手術當天早上「請勿」服用
_____ (ACEI): 繼續服用 / 手術當天早上「請勿」服用
_____ (ARB): 繼續服用 / 手術當天早上「請勿」服用

特殊藥物：

Aspirin 阿斯匹靈： <input type="checkbox"/> 繼續服用 <input type="checkbox"/> 手術前 5 天停止服用 <input type="checkbox"/> 僅在外科醫生要求下，手術前 5 天停止服用
Plavix/Clopidigrel 波立維/氯吡格雷: <input type="checkbox"/> 繼續服用 <input type="checkbox"/> 手術前 5 天停止服用 <input type="checkbox"/> 僅在外科醫生要求下，手術前 5 天停止服用
Warfarin/Coumadin: 華法林/香豆素: <input type="checkbox"/> 繼續服用 <input type="checkbox"/> 手術前 5 天停止服用 <input type="checkbox"/> 遵守過渡期指示
Insulin 胰島素：手術前照常晚上服用。手術當天早上，服用平常早上的一半劑量：_____ 胰島素（_____ 單位）。
Other instructions 其他指示：

Escort contact 陪同人員聯絡資訊（姓名、電話）：

Date 日期 _____ Signature 簽名： _____

O. Radke/S. Banden, 24-Jul-13