

Инструкции по эндоскопии ЖКТ в больнице ZSFG — эндоскопия верхнего отдела ЖКТ

ДАТА ПРИЕМА: _____ ВРЕМЯ ПРИЕМА: _____

- Если в этом поле стоит пометка, Вам необходимо прийти в клинику на предоперационный осмотр, проводимый анестезиологом: _____

РЕГИСТРАЦИЯ. Зарегистрируйтесь в главной приемной в здании 25. Поднимитесь на лифте на этаж G и зайдите в комнату G1 (комната ожидания).

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ ДО ПРОЦЕДУРЫ :	<ul style="list-style-type: none"> ● Прекратите прием препаратов железа (ferrous sulfate /сульфат железа).
---------------------------------------	---

АСПИРИН И АНТИКОАГУЛЯНТЫ	<i>ЕСЛИ В ПОЛЕ НИЖЕ НЕ СТОИТ ПОМЕТКА, <u>ПРОДОЛЖАЙТЕ</u> принимать аспирин и антикоагулянты по назначению врача.</i>
	<input type="checkbox"/> Прекратите принимать аспирин (aspirin), ибупрофен (ibuprofen) и напроксен (naproxen) за семь дней до процедуры.
	<input type="checkbox"/> Прекратите принимать клопидогрель/clopidogrel (Plavix) за семь дней до процедуры.
	<input type="checkbox"/> Прекратите принимать варфарин/warfarin (Coumadin) за пять дней до процедуры.
	<input type="checkbox"/> Прекратите принимать ривароксабан/rivaroxaban (Xarelto), апиксабан/apixaban (Eliquis), дабигатран/dabigatran (Pradaxa) и эдоксабан/edoxaban (Savaysa) за два дня до процедуры.
<input type="checkbox"/> Не принимайте эноксапарин/enoxaparin (Lovenox) в день процедуры.	

ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО ПРОЦЕДУРЫ :	<ul style="list-style-type: none"> ● Ешьте небольшими порциями, но последний прием пищи должен быть не позднее полуночи. Не ешьте твердую пищу после полуночи.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Если у Вас диабет: принимайте половину вашей обычной дозы таблеток и/или половину обычной дозы инсулина.

В ДЕНЬ ПРОЦЕДУРЫ :	<ul style="list-style-type: none"> ● Если у Вас диабет: в этот день не принимайте лекарственные средства от диабета или инсулин.
------------------------------	--

Чтобы отменить/перенести прием или задать вопросы, звоните по телефону (628) 206-8823.

Посмотрите короткое видео с этими инструкциями:

<http://www.sfhealthnetwork.org/need-to-visit-a-specialist-doctor/gastroenterology>

Инструкции по эндоскопии ЖКТ в больнице ZSFG — эндоскопия верхнего отдела ЖКТ

	<ul style="list-style-type: none">● ПРИНИМАЙТЕ ВСЕ ПРОЧИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ ВЫ ОБЫЧНО ПРИНИМАЕТЕ, если нет других указаний.
	<ul style="list-style-type: none">● Разрешается пить прозрачные жидкости, однако вы должны перестать пить за три часа до прибытия в больницу.
	<ul style="list-style-type: none">● Приведите с собой взрослого, который отвезет Вас домой после процедуры (если у Вас нет такой возможности, позвоните по телефону 628-206-0171 и мы организуем для Вас машину).
	<ul style="list-style-type: none">● Если в этот день Вы также проходите процедуру рН-метрии BRAVO, Вы получите отдельные инструкции.

Что такое верхняя эндоскопия?

Верхняя эндоскопия (также известная как ЭГДС) — это исследование, проводимое для оценки состояния верхнего отдела пищеварительного тракта. Во время процедуры врач осматривает внутреннюю оболочку пищевода, желудка и первого отдела тонкой кишки через тонкую гибкую трубку, называемую эндоскопом. Если во время процедуры будут обнаружены наросты и прочие аномалии, врач может провести биопсию и извлечь аномальную ткань для дальнейшего изучения.

Вам потребуется провести до двух часов в центре эндоскопии в день процедуры. Сама процедура занимает около 15 минут.

Что происходит перед процедурой верхней эндоскопии?

- Вы переоденетесь в больничную рубашку.
- Медсестра установит капельницу (линию IV) Вам в руку или кисть.
- Врач обсудит с Вами Вашу историю болезни и даст подписать формы информированного согласия.

Что происходит во время процедуры верхней эндоскопии?

- Через капельницу будет вводиться лекарственное средство, которое поможет Вам расслабиться и прийти в состояние дремоты.
- Ваш пульс, артериальное давление и уровень кислорода в крови будут под наблюдением.
- Врач введет эндоскоп Вам в рот и будет медленно продвигать его через пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку (первый отдел тонкого кишечника).
- Во время процедуры Вы можете испытывать рвотные позывы, ощущение давления или наполненности.
- Если врач обнаружит аномальные ткани, он может взять биопсию через эндоскоп для более тщательного исследования. Биопсия тканей безболезненна.

Чтобы отменить/перенести прием или задать вопросы, звоните по телефону (628) 206-8823.

Посмотрите короткое видео с этими инструкциями:

<http://www.sfhealthnetwork.org/need-to-visit-a-specialist-doctor/gastroenterology>

Инструкции по эндоскопии ЖКТ в больнице ZSFG — эндоскопия верхнего отдела ЖКТ

Что происходит после процедуры верхней эндоскопии?

- Медсестра сообщит Вам результаты верхней эндоскопии.
- Врач подготовит полное заключение для лечащего врача, направившего Вас на эндоскопию, и выдаст Вам копию, которую можно забрать домой.
- Вы можете почувствовать вздутие живота или боль в горле. Это нормальное явление, которое быстро пройдет.
- Лекарственные средства, которые вводятся во время процедуры верхней эндоскопии, не позволят Вам управлять автомобилем до конца дня. Избегайте употребления алкоголя в течение 24 часов после процедуры. В остальном Вы сможете вернуться к обычной деятельности и режиму питания по завершении процедуры.
- Медсестра предоставит Вам подробную инструкцию по выписке перед вашим уходом из центра эндоскопии.

Чтобы отменить/перенести прием или задать вопросы, звоните по телефону (628) 206-8823.

Посмотрите короткое видео с этими инструкциями:

<http://www.sfhealthnetwork.org/need-to-visit-a-specialist-doctor/gastroenterology>